

# Систематический анализ исследований противоопухолевых эффектов хондропротекторов глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата

Д.м.н. О.А. Громова<sup>1,2</sup>, к.ф.-м.н. И.Ю. Торшин<sup>1,2</sup>, профессор А.М. Лила<sup>3</sup>,  
Д.м.н. И.С. Романов<sup>4</sup>, профессор А.Г. Назаренко<sup>5</sup>

<sup>1</sup>ФИЦ ИУ РАН, Москва

<sup>2</sup>ЦХАБД, ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва

<sup>3</sup>ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, Москва

<sup>4</sup>ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

<sup>5</sup>ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва

## РЕЗЮМЕ

Хондроитина сульфат (ХС) и глюкозамина сульфат (ГС) используют в терапии патологии суставов. Противовоспалительные и иммуномодулирующие эффекты ХС/ГС указывают на гораздо более широкий спектр клинического применения ХС и ГС. В настоящей работе представлены результаты систематического анализа фундаментальных и клинических исследований противоопухолевых эффектов ХС/ГС. ХС и ГС проявляют схожие механизмы противоопухолевого действия, снижая хроническое воспаление (прежде всего посредством ингибирования каскада ФНО/NF-κB) и способствуя запуску процессов апоптоза опухолевых клеток. Взаимодействуя с рецептором CD44 и модулируя процесс O-гликозилирования клеточных белков, ГС способствует снижению экспрессии провоспалительных цитокинов ЦОГ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ингибированию сигнальных путей PI3K/AKT и пролиферации клеток. Молекулы ХС стимулируют апоптоз опухолевых клеток, подавляют экспрессию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) и активность матриксных металлопротеиназ. Способствуя инкапсуляции опухолевых образований, ХС тормозит процесс метастазирования. Результаты крупномасштабных клинических исследований указывают на перспективность использования ХС/ГС для долговременной профилактики опухолевых заболеваний.

**Ключевые слова:** опухолевые заболевания, нутритивная поддержка, методы анализа больших данных, Хондрогард®, Сустагард® Артро.

**Для цитирования:** Громова О.А., Торшин И.Ю., Лила А.М. и др. Систематический анализ исследований противоопухолевых эффектов хондропротекторов глюкозамина сульфата и хондроитина сульфата. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;1(\*):1–9.

## ABSTRACT

Systematic study review on antitumor effects of glucosamine and chondroitin sulfate cartilage protectors

O.A. Gromova<sup>1,2</sup>, I.Yu. Torshin<sup>1,2</sup>, A.M. Lila<sup>3</sup>, I.S. Romanov<sup>4</sup>, A.G. Nazarenko<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Federal Research Center "Informatics and Management" of the Russian Academy of Sciences, Moscow

<sup>2</sup>Big Data Storage and Analysis Center of the Lomonosov Moscow State University

<sup>3</sup>V.A. Nasonova Research Institute of Rheumatology, Moscow

<sup>4</sup>N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Moscow

<sup>5</sup>Burdenko National Medical Research Center for Neurosurgery, Moscow

Chondroitin sulfate (CS) and glucosamine sulfate (GS) are used in joint pathology therapy. Anti-inflammatory and immunomodulatory CS/GS effects indicate an extended range of CS and GS clinical use. This article presents the systematic analysis of the fundamental and clinical study results on the CS/GS antitumor effects. CS and GS demonstrate a similar antitumor action mechanism, reducing chronic inflammation (primarily by inhibiting the TNF/NF-κB cascade) and promoting the tumor cell apoptosis onset. Interacting with the CD44 receptor and modulating the cell proteins O-glycosylation, GS helps to reduce the COX-2, IL-6, IL-8 proinflammatory cytokines expression, the PI3K/AKT signal pathways inhibition and cell proliferation. CS molecules induce tumor cell apoptosis, inhibit vascular endothelial growth factor (VEGF) expression and matrix metalloproteinase activity. Also, CS inhibits the metastasis process, contributing to the tumor mass encapsulation. The large-scale clinical study results indicate the prospects for the CS/GS use for tumor disease long-term prevention.

**Keywords:** tumor diseases, nutritional supplementation, big data analysis methods, Chondrogard®, Sustaguard® Arthro.

**For citation:** Gromova O.A., Torshin I.Yu., Lila A.M. et al. Systematic study review on antitumor effects of glucosamine and chondroitin sulfate cartilage protectors. RMJ. Medical Review. 2019;1(\*):1–9.

## ВВЕДЕНИЕ

Стандартизированные фармацевтические формы хондроитина сульфата (ХС) и глюкозамина сульфата (ГС) являются эффективными и безопасными хондропротекторами, позволяющими осуществлять долговременную терапию остеоартрита и других патологий суставов. ХС и ГС способ-

ствуют реконструкции соединительнотканной основы хряща и обладают анальгетическим и противовоспалительным действием. Взаимодействуя с рецепторами CD44, TLR4 и ICAM1 на поверхности различных клеток, ХС и ГС ингибируют провоспалительный транскрипционный фактор NF-κB и цитокиновый сигнальный путь JAK/STAT. Поэтому

стандартизированные формы ХС/ГС наряду с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) могут использоваться в терапии не только патологии суставов [1], но и других заболеваний, в патогенезе которых имеется компонент хронического воспаления.

Важными перспективными направлениями применения ХС/ГС являются долговременная профилактика и адъювантная терапия опухолевых заболеваний. Эти фармакологические эффекты ХС/ГС известны достаточно давно: первые работы, посвященные ингибированию роста опухолей глюкозамином, были опубликованы еще в начале 1950-х гг. [2–4]. Противоопухолевое действие ХС/ГС обусловлено, в частности, тем, что ХС и ГС способствуют снижению хронического воспаления, в т. ч. опосредованного фактором некроза опухолей (ФНО).

Хемореактомный анализ молекулы показал, что ГС и самостоятельно, и в сочетании с НПВП проявляет следующие биологически активные свойства: 1) ингибирует белки метаболизма простагландинов и лейкотриенов, 2) ингибирует провоспалительный эффект транскрипционного фактора NF-κB, участвующего в осуществлении действия ФНО-α, 3) снижает экспрессию провоспалительных цитокинов в культуре клеток, 4) ингибирует различные матриксные металлопротеиназы, 5) обладает вазодилататорными и антидиабетическими эффектами в отношении культуры клеток [5]. Эти эффекты важны для профилактики и терапии опухолевых заболеваний.

Хемотранскриптомный анализ молекулы ГС при воздействии на фибробласты линии FIBRNPC показал, что ГС не только ингибирует активность NF-κB и других провоспалительных белков, но и способствует снижению транс-


крипции генов, вовлеченных в провоспалительный сигнальный каскад NF-κB (NFKB2, TNFRSF1B, PYCARD, TRAF2, TNFSF12 и др.) и генов белков, осуществляющих передачу сигнала на разных уровнях каскада NF-κB (CD44, TLR4, ICAM1, NF-κB, JAK/STAT и др.). ГС может в существенной мере снижать экспрессию генов, вовлеченных в процесс деления клетки и транскрипцию генов [6]. Комплексное противовоспалительное и цитостатическое действие ГС является патогенетическим при лечении не только остеоартрита, но и коморбидных заболеваний, сопровождающихся хроническим воспалением, в т. ч. опухолевых заболеваний.

В настоящей работе представлен систематический анализ противоопухолевых эффектов ХС/ГС. Количество публикаций по данному вопросу достаточно велико: например, только по запросу «(Cancer OR cancers OR tumor OR tumors OR tumour OR tumours) AND (glucosamine OR chondroitin)» в базе данных биомедицинских публикаций PUBMED найдено 5129 ссылок, из них по эффектам ГС — 2659 ссылок. В рамках настоящей работы мы осуществили компьютеризованный анализ данного массива публикаций с использованием современных методов анализа больших данных [7, 8], развиваемых в рамках топологического [9] и метрического [10, 11] подходов к задачам распознавания/классификации [12, 13]. В качестве контрольной выборки публикаций использовались 5129 случайно выбранных статей из 4 226 339 найденных по запросу «(Cancer OR cancers OR tumor OR tumors OR tumour OR tumours) NOT glucosamine NOT chondroitin» в базе данных PUBMED. В результате проведенного анализа текстов были отобраны наиболее информативные ключевые слова, описывающие взаимосвязь ХС/ГС с патофизиологией и клиникой опухолевых патологий (табл. 1).

**Таблица 1.** Ключевые слова в абстрактах публикаций, описывающих участие ХС/ГС в патофизиологии опухолевых заболеваний

Ключевое слово (англ.)	Ключевое слово (рус.)	$v_1$	$v_2$	$D_{инф}$	$\alpha$
NEOPLASMS	Новообразования	0,378	0,001	1937,0	5
CELL LINE	Клеточная линия	0,284	0,000	1457,0	13
CELLS CULTURED	Клетки в культуре	0,239	0,000	1225,0	21
PROTEOGLYCANS	Протеогликаны	0,225	0,000	1152,0	25
EXTRACELLULAR MATRIX	Внеклеточный матрикс	0,091	0,009	439,3	99
RECEPTORS	Рецепторы	0,083	0,000	427,5	102
ADHESION	Клеточная адгезия	0,074	0,000	380,0	136
LECTINS	Лектины	0,072	0,000	368,0	149
CELL MEMBRANE	Клеточная мембрана	0,062	0,000	316,0	181
EXPRESSION REGULATION	Регуляция экспрессии	0,060	0,000	308,0	188
TUMOR NECROSIS FACTOR	Фактор некроза опухоли	0,050	0,000	259,0	241
LEUKEMIA	Лейкемия	0,046	0,000	235,0	266
ANTINEOPLASTIC AGENTS	Противоопухолевые препараты	0,041	0,000	211,5	310
MANNOSE	Манноза	0,041	0,001	209,5	317
MELANOMA CELLS	Клетки меланомы	0,037	0,003	179,8	401
COLONIC NEOPLASMS	Новообразования толстой кишки	0,030	0,000	155,0	488
APOPTOSIS	Апоптоз	0,030	0,000	153,0	493
LUNG NEOPLASMS	Новообразования легких	0,030	0,000	152,0	499
BREAST NEOPLASMS	Новообразования молочной железы	0,029	0,000	151,0	501
METASTASIS	Метастазирование	0,029	0,000	151,0	503
GLIOMA	Глиома	0,023	0,001	115,4	261
KINASES	Киназы	0,022	0,000	115,0	702
(ANTI)PROLIFERATION DRUG	Антипролиферативные средства	0,022	0,000	114,5	704
CD44	CD44	0,021	0,004	90,8	919
LYMPHOCYTE	Лимфоцит	0,013	0,000	67,0	1318
NF-KAPPA B	NF-κB	0,013	0,000	66,0	1339
OVARIAN NEOPLASMS	Новообразования яичников	0,013	0,000	65,0	1375
MATRIX METALLOPROTEINASE	Матричная металлопротеиназа	0,011	0,000	57,0	1579
PROSTATIC NEOPLASMS	Новообразования предстательной железы	0,010	0,000	53,0	1704

**Примечание.**  $v_1$ ,  $v_2$  – частота встречаемости ключевого слова в выборке абстрактов  $K_1$  (абстракты по исследуемой теме) и в выборке абстрактов  $K_2$  (контрольная выборка абстрактов),  $D_{инф}$  – оценка значения информативности ключевого слова для различения выборок  $K_1$  и  $K_2$ ;  $\alpha$  – ранг информативности (порядковый номер ключевого слова при упорядочении всех ключевых слов по значениям  $D_{инф}$ ). Порядок ключевых слов – по убыванию значений оценки информативности  $D_{инф}$ .



**Рис. 1.** Опухолевые патологии, ассоциированные с нарушениями обмена ХС/ГС. (А) Биохимические маркеры, (Б) доброкачественные новообразования, (В) злокачественные новообразования. Описание контрольной выборки текстов представлено в тексте статьи. Достоверность различий в числах публикаций оценивалась по тесту  $\chi^2$ ; для всех показанных различий  $P < 10^{-5}$

Анализ полученного списка наиболее информативных ключевых слов (табл. 1), составленного на основе анализа всего массива публикаций результатов клинических, биохимических, экспериментальных исследований ХС/ГС, позволяет утверждать, что ХС/ГС, участвуя в формировании *протеогликанов внеклеточного матрикса, лектинов* и в *клеточной адгезии*, также влияют на формирование *новообразований* и *метастазирование* опухолей различных типов (*лейкемия, меланома, глиома, новообразования толстой кишки, легких, молочной железы, яичников, предстательной железы*).

Важными молекулярными механизмами противоопухолевого действия ХС/ГС, приводящими к *апоптозу* линий *опухолевых клеток*, являются активация *рецептора CD44* (приводящая к ингибированию эффектов *NF- $\kappa$ B*, фактора некроза опухоли, матричных металлопротеиназ), гликозилирование *рецепторов, регуляция экспрессии генов*. Поэтому ХС/ГС могут являться ценным дополнением к адъювантной терапии с использованием *противоопухолевых препаратов*, в т. ч. *антипролиферативных средств* и ингибиторов различных *киназ*.


Дальнейший анализ информативных ключевых слов с последующей рубрикацией текстов исследований по диагнозам МКБ-10 позволил охарактеризовать опухолевые

патологии, ассоциированные с нарушениями обмена ХС/ГС и описанные в исследуемой выборке из 5129 публикаций (рис. 1).

Далее мы последовательно рассмотрим молекулярные механизмы противоопухолевого действия ГС, механизмы противоопухолевого действия ХС (в частности, роли паттернов сульфатирования ХС) и результаты нескольких крупномасштабных клинико-эпидемиологических исследований противоопухолевых эффектов ХС/ГС.

### МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ГС: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ

В эксперименте пероральный прием олигомеров ГС и N-ацетил-D-глюкозамина приводил к торможению развития опухолей. По сравнению с контролем олигомеры ГС значительно подавляли рост опухоли у мышей и стимулировали выраженный апоптоз опухолевых клеток на фоне более высоких уровней интерлейкина-12 и интерферона-гамма, что указывает на активацию врожденного противоопухолевого иммунитета [14].



**Рис. 2.** Жизнеспособность культур опухолевых клеток линий DU145, A2058 и PC3 (карцинома предстательной железы человека) дозозависимо снижается в присутствии GS в течение 48 ч. Жизнеспособность клеток измеряли подсчетом клеток с использованием колориметрического теста Janus green

GS ингибирует экспрессию ЦОГ-2 и провоспалительного интерлейкина ИЛ-8 в клетках линии MCF-7 рака молочной железы человека. GS эффективно подавляет активацию экспрессии генов ЦОГ-2 и ИЛ-8, вызываемую протеинкиназой С (PKC), синтез простагландина E2 и ИЛ-8. GS также способствовал деградации белков ЦОГ-2 и ИЛ-8 кальпаин-зависимым и протеасом-зависимым образом при участии сигнального пути NF-κB. GS ослаблял PKC-опосредованное фосфорилирование, снижая активацию NF-κB через рецептор CD44, что значительно ингибировало рост трансплантатов рака молочной железы в эксперименте [15]. GS также ингибирует опосредованную ИЛ-1-бета продукцию ИЛ-8 в клеточных линиях DU-145 и PC-3 рака предстательной железы [16].

Противоопухолевая активность GS проявляется посредством ингибирования глобальной N-связанного гликозилирования — посттрансляционной модификации, которая важна для стабильности и функции внутриклеточных белков. Клетки линии DU145 (карцинома предстательной желе-

зы человека) экспрессируют ИЛ-6, что активирует передачу сигналов по каскаду ИЛ-6/STAT3. Субъединицы рецептора ИЛ-6 (белок gp130) подвергаются N-гликозилированию. GS уменьшал N-гликозилирование рецепторов gp130, связывание ИЛ-6 с клетками и фосфорилирование сигнальных белков JAK2, SHP2 и STAT3 [17], что способствовало снижению популяции опухолевых клеток 3 исследованных линий (рис. 2). Инактивируя белок STAT3, GS также снижает жизнеспособность клеток — предшественников рака молочной железы человека [18].


Противораковое действие GS также проявляется посредством индуцированной глюкозамином модификации O-гликозилирования, что приводит к ингибированию фосфорилирования сигнальным белком FOXO и, как результат, ингибированию активности сигнальных путей PI3K/AKT и MAPK/ERK [19].

### МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ GS: ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ

Помимо воздействия на гликозилирование и ингибирования NF-κB, приводящего к ослаблению эффектов ФНО-α и других провоспалительных цитокинов, противоопухолевые эффекты GS могут осуществляться и посредством других молекулярных механизмов.

Например, GS ингибирует метаболизм тимидина в опухолевых клетках. Глюкозамин ингибирует поглощение тимидина, фосфорилирование тимидина и увеличивает утечку тимидина во внеклеточное пространство. Глюкозамин также напрямую ингибирует фермент тимидинкиназу [20]. Уменьшая доступный для опухоли пул уридиновых нуклеотидов, эти эффекты GS способствуют гибели опухолевых клеток [21].

Антипролиферативное действие GS в опухолевых клетках связано с остановкой цикла клеточного деления в фазе G0/G1. GS дозозависимо ингибировал пролиферацию опухолевых клеток линий 786-O и Saki-1 рака почки (рис. 3) и стимулировал апоптоз опухолевых клеток. Экспрессия регуляторных белков Cyclin D1, CDK4 и CDK6, которые способствуют фазовому переходу G1/S во время пролифе-



**Рис. 3.** Глюкозамин вызывает ингибирование пролиферации опухолевых клеток линий 786-O и Saki-1 (рак почки). Клетки обрабатывали GS в различных концентрациях (0 мМ, 1 мМ, 5 мМ и 10 мМ); жизнеспособность клеток анализировали колориметрическим тестом метаболической активности. \* – P<0,05 по сравнению с контролем (0 мМ)

рации, была значительно подавлена на фоне повышения уровней ингибиторов клеточного цикла p21 и p53 [22].

Производное глюкозамина (молекула NSPA) индуцирует экспрессию ингибитора сериновой протеазы *Masp1n* — белка-супрессора опухолей при различных типах рака, в т. ч. при раке простаты. Производное глюкозамина блокирует пролиферацию клеток линии РСЗ, не чувствительных к андрогенам, ингибируя продукцию циклина-D1 и индуцируя апоптоз опухолевых клеток [23].

ГС стимулирует гибель опухолевых клеток посредством ингибирования протеасом. В клетках рака предстательной железы человека линии ALVA41 ингибирование протеасомной активности приводило к накоплению убиквитинированных белков с последующей индукцией апоптоза. ГС снижал активность PA28 — белка — активатора протеасом через O-гликозилирование белков [24].

ГС вызывает аутофагическую гибель опухолевых клеток посредством стимуляции стресса в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР-стресс) опухолевых клеток. В экспериментах на культуре клеток глиомы человека линии U87MG ЭР-стресс, вызванный ГС, проявлялся в индукции экспрессии генов BiP, IRE1-альфа и фосфо-eIF2-альфа, что соответствует торможению пролиферации и инициации апоптоза опухолевых клеток [25].

Производное ГС, фенилглюкозамин, *инактивирует рецептор андрогенов* в опухолевых клетках мочевого пузыря при участии микроРНК miR-449a, что снижает пролиферацию андроген-зависимых клеток карциномы мочевого пузыря [26].

В клетках линий DU145 (рак предстательной железы) и MDA-MB-231 (рак молочной железы) ГС *тормозит пролиферацию посредством ингибирования p70S6K* — сигнального белка, участвующего в трансляции всех белков. Глюкозамин уменьшал фосфорилирование белка p70S6K и его субстратов RPS6 и eIF-4B. Кроме того, глюкозамин усиливал эффекты ингибирования пролиферации рапамицином, специфическим ингибитором белка mTOR [27].

N-ацетилглюкозамин *стимулирует апоптоз клеток опухолей легкого посредством фактора TRAIL и активации белка DR-5*. Белок TRAIL является потенциальным противораковым агентом. Однако многие клетки мелкоклочного рака легких (NSCLC) частично устойчивы к TRAIL, что ограничивает его клиническое применение. В эксперименте совместное применение белка TRAIL и N-ацетилглюкозамина увеличивало накопление и кластеризацию DR5, что, в свою очередь, активировало проапоптотическую каспазу-8. N-ацетилглюкозамин способствовал кластеризации рецептора DR5 путем улучшения его O-гликозилирования [28].

## МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ХС

ХС ингибирует пролиферацию клеток посредством (1) увеличения экспрессии ингибитора циклин-зависимой киназы (CDKN1, белок p21), (2) увеличения апоптоза за счет активации каспазы-3, (3) подавления экспрессии фактора роста эндотелия сосудов фактор (VEGF), (4) увеличения экспрессии тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 (TIMP-1) и подавления матриксных металлопротеиназ (ММП). Эти эффекты, сопровождающиеся значительным ингибированием сигнального пути NF-κB [29], характерны и для ГС, и для ХС.

Одним из важных аспектов противоопухолевого действия ХС является *инкапсуляция опухолей*. Микроокружение опухоли является привлекательной терапевтической мишенью для лечения рака. Эндогенный ХС как часть клеточной микросреды состоит из длинных линейных цепочек повторяющихся дисахаридных звеньев, ковалентно связанных с белками с образованием ХС-протеогликанов [30].

Резко повышенные уровни ХС наблюдаются в стромальном компартменте многих солидных опухолей, включая рак молочной железы. Это обусловлено, по всей видимости, тем, что ХС ингибирует инвазию опухоли и защищает окружающие ткани от метастазирования. Например, в моделях опухолей мозга ХС-протеогликанов вызывают выход реактивных астроцитов из опухолевой массы, что приводит к инкапсуляции опухолевых поражений. Формирующаяся астроглиотическая капсула ингибирует инвазию опухоли [31].


В эксперименте было показано, что разрушение капсулы, сформированной из ХС вокруг новообразований, ускоряет рост опухолей и способствует метастазированию. Например, ферментативная элиминация эндогенного ХС, проводимая посредством внутриопухолевых инъекций хондроитиназы АВС, приводила к увеличению метастазирования и ускоренному росту вторичных опухолей [30].

Эксперименты на культуре клеток также подтверждают противоопухолевые эффекты ХС. Дисахариды ХС показали противоопухолевый потенциал по отношению к клеткам рака толстой кишки человека [32]. В экспериментах на клетках линии HT-1376 (опухоль мочевого пузыря) ХС усиливает противоопухолевую активность гемцитабина и митомидина-С. ХС приводил к ингибированию роста опухолевых клеток на 50% через 72 ч. Комбинация ХС + гемцитабин в соотношении 1:1 индуцировала апоптоз опухолевых клеток посредством активации каспазы-9 и каспазы-3 [33].

## ПАТТЕРНЫ СУЛЬФАТИРОВАНИЯ ХС И ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ ХС

Противоопухолевые эффекты эндогенных и экзогенных ХС могут зависеть от паттернов сульфатирования ХС. Начальная стадия инвазии состоит в прикреплении опухолевой клетки к внеклеточному матриксу через эндогенные молекулы ХС. При этом образуется С-концевой внутриклеточный фрагмент N-кадгерина, взаимодействующий с бета-катенином. Эти эффекты существенно зависят от длины цепи и характера сульфатирования молекулы ХС. Делеция гена хондроитин-4-O-сульфотрансферазы-1 (CHST-1), который увеличивает 4-O-сульфатирование ХС и длину цепи ХС, подавляет активацию пути N-кадгерин / бета-катенин посредством эндоцитоза N-кадгерина и значительно уменьшает инвазию клеток BT-549 [34].

Следует отметить, что во время прогрессирования и метастазирования рака эндогенные ХС в строме опухолей претерпевают аномальные изменения в составе и в структуре: уменьшается соотношение между дерматансульфатом и ХС, изменяется паттерн сульфатирования ХС [35]. В опухолевых клетках наблюдаются нарушения экспрессии различных ферментов, синтезирующих эндогенные ХС и дерматансульфаты. В частности, повышается экспрессия дерматансульфат-эпимеразы, хондроитин-синтазы I, хондроитин-4-сульфотрансфераз CHST11, CHST12 и CHST15 [36], фактора полимеризации хондроитина в опухолях и снижается экспрессия хондроитин-6-сульфотрансферазы 3 [37].



**Рис. 4.** Хондроитин-4,6-сульфат тормозит инвазию метастазов и миграцию клеток линии EMT6 (рак молочной железы). (А) клетки EMT6, обработанные 100 мкг/мл ХС-4, ХС-6, ХС-2,6, ХС-4,6 (ХС-Е) в течение 6 сут. На 6-е сут был подсчитан процент трехмерных структур, содержащих 5 или более инвазивных выступов (стрелки). (Б) Ингибирование инвазивных выпячиваний при метастазировании зависит от концентрации ХС-4,6

Клинические исследования показали, что пациенты с опухолями шеи выделяют с мочой ХС низкой степени сульфатирования [38]. Отмечена корреляция между содержанием несulfатированных дисахаридов и стадией прогрессирования опухолей [39]. Повышенная экспрессия несulfатированного хондроитина коррелирует с неблагоприятными клинико-патологическими параметрами при раке предстательной железы, включая более тяжелую стадию заболевания, более высокий балл по шкале Глисона и более высокий уровень простатспецифического антигена (ПСА) [40].

Таким образом, особенности сульфатирования ХС связаны с состоянием пациентов с опухолевыми заболеваниями. Систематический экспериментальный анализ дисахаридов ХС, проведенный в исследовании [41], позволил выявить паттерны сульфатирования ХС, которые способствуют ингибированию опухолей молочной железы. Для этого были синтезированы молекулы дисахаридов ХС, соответствующие 16 возможным паттернам сульфатирования, затем было изучено их влияние на опухолевые клетки [41]. Результаты показали достоверное увеличение активности каспазы-3 и каспазы-7 при обработке клеток линии MDA-MB-231 (рак молочной железы) ди- и трисульфатированными дисахаридами ХС.

Первичные карциномы яичников и их метастазы содержат 4,6-дисульфатированные ХС, которые способствуют адгезии опухолевых клеток [42]. В то же время эксперименты на культуре клеток показали, что хондроитин-4,6-сульфат (известен также как ХС-Е, ХС-4,6) снижает подвижность опухолевых клеток (рис. 4) и ингибирует про-онкогенную передачу сигналов по каскаду Wnt/бета-катенин [43].


Торможение активности каскада Wnt — важный механизм противоопухолевого действия дисульфатированного ХС-4,6. В отсутствие стимуляции Wnt3a уровни бета-катенина были низкими и наблюдались в основном в мембране опухолевых клеток линий EMT6 и 4T1 (рак молочной железы, рис. 5). Активация каскада Wnt3a приводила к резкому увеличению уровня бета-катенина в клеточном ядре. Добавление ХС-4,6 к среде значительно снижает уровни бета-катенина, подтверждая, что ХС-4,6 является мощным ингибитором передачи сигналов Wnt/бета-катенин в клетках рака молочной железы [43].

В целом различия в длине цепи и паттерне сульфатирования ХС оказывают влияние на проявление противоопухолевых свойств ХС. Оптимальная длина цепей ХС в высокоочищенной фармацевтической субстанции CS b-Bioactive® обеспечивает медленное высвобождение коротких олигосахаридов. Соотношение различных форм сульфатирования ХС в фармацевтической субстанции CS b-Bioactive® (60% ХС-4, 30% ХС-6) [44] обеспечивает эффективную работу хондроитиназы, карбогидрат сульфотрансферазы и других ферментов, которые диверсифицируют паттерн сульфатирования синтезируемых из ХС олигосахаридов (способствуя в т. ч. синтезу ХС-4,6). Синтезируемые таким образом дисахариды ХС избирательно накапливаются в опухолевой ткани, проявляя описанные выше эффекты.

### Клинико-эпидемиологические исследования противоопухолевых эффектов ХС/ГС

Разносторонние молекулярные механизмы противоопухолевого действия ГС, установленные в ходе фундаментальных исследований, указывают на перспективность использования ХС и ГС в профилактике и терапии опухолевых заболеваний. Очень важной характеристикой молекул ГС и ХС является их *таргетное накопление в опухолевой ткани*. Например, наногели ХС-метотрексат значительно повышают растворимость и улучшают эффективность доставки метотрексата к опухоли благодаря связыванию ХС с рецептором CD44 [45]. ГС и N-ацетилглюкозамин являются перспективными контрастными веществами для проведения МРТ при визуализации опухолей, т. к. оба вещества нетоксичны и имеют тенденцию дозозависимо накапливаться и удерживаться в области опухоли [46].

Результаты крупномасштабного клинического эпидемиологического «Исследования по профилактике рака II» (Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort, n=113067) показали, что *регулярное употребление ГС снижает риск развития колоректального рака*. За группой наблюдали в течение 10 лет, за этот период было зарегистрировано 1440 случаев заболевания. Прием ГС был ассоциирован с более низким риском заболевания (ОР 0,83; 95% ДИ 0,71–0,97), чем в контрольной группе [47].



**Рис. 5.** ХС-4,6 ингибирует передачу сигналов Wnt/бета-катенин в клетках рака молочной железы EMT6 и 4T1. Иммунофлуоресцентное обнаружение бета-катенина в монослоях клеток EMT6 или 4T1, обработанных Wnt3a, в присутствии или в отсутствие ХС-4,6. Wnt3a-СМ привел к резкому увеличению уровней внутриядерного бета-катенина. Обработка клеток ХС-4,6 значительно снижала уровни экспрессии внутриядерного бета-катенина. Красные треугольники: окрашивание клеточной мембраны; красные стрелки: окрашивание ядра, бета-катенин: зеленый; ядра, окрашенные DAPI: синий; масштаб – 50 мкм

# ХОНДРОГАРД® и СУСТАГАРД® АРТРО

## СТАРТ-терапия остеоартрита и остеохондроза

- **СТАРТ-терапия<sup>1,2,3,4</sup>:**  
схема чередования парентеральных форм хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата
- **Базисная терапия<sup>5</sup>:**  
пероральный глюкозамина сульфат в виде саше СУСТАГАРД® АРТРО



### • ХОНДРОГАРД®

#### ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТ

Раствор для внутримышечного и внутрисуставного введения  
1 мл №10, 2 мл №10, 2 мл №25

ЛСР-005817/09



### • СУСТАГАРД® АРТРО

#### ГЛЮКОЗАМИН

Концентрат для приготовления раствора для внутримышечного введения 200 мг/мл в комплекте с растворителем №5 (5 ампул А по 2 мл, 5 ампул Б по 1 мл)

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1,5 г №20

ЛСР-009268/09, ЛП-003149

Реклама



1. М.И.Удвика, «Сравнительная эффективность инъекционных и пероральных симптоматических препаратов медленного действия в терапии первичного и посттравматического остеоартроза коленных суставов». РМЖ Ревматология №7, 2017  
2. А.В.Наумов, М.Н.Шаров, Н.О.Ховасова, Ю.С.Прокофьева, «Результаты применения интермиттирующей схемы парентерального введения хондроитина сульфата и глюкозамина сульфата в старт-терапии хронической боли в суставах и спине у коморбидных пациентов». РМЖ Неврология №11, 2018  
3. А.В. Наумов, О.Н. Ткачева, Н.О. Ховасова, «Обострения хронической боли в спине у коморбидных больных: терапия на перспективу». РМЖ Ревматология №5, 2018  
4. Л.В.Васильева, А.В.Никитин, Е.Ф.Евстратова, Н.С. Бурдина, «Опыт сочетанного парентерального применения глюкозаминсульфата и хондроитинсульфата у больных с остеоартритом». Сборник тезисов/ Под редакцией: Академика РАН Мазурова В.И., доцента Трофимовой Е.А., Спб.: Изд-во «Человек и его здоровье», 2018  
5. В.В. Бадокин, «Сустагард Артро - новый препарат глюкозамина сульфата в терапии остеоартроза», ФАРМАТЕКА, 2016, №19

Регулярное использование ГС/ХС в крупномасштабном исследовании здоровья медсестер ( $n=65\ 000$ ) было ассоциировано с более низким риском заболеваемости колоректальным раком. За 8 лет наблюдений было зарегистрировано 672 случая заболевания. Регулярное потребление ГС было связано с 21% снижением риска (ОР 0,79; 95% ДИ: 0,63–1,00), ХС — с 23% снижением риска (ОР 0,77; 95% ДИ: 0,59–1,01). Ассоциации сохранялись после поправок на пол, использование аспирина, ИМТ, физическую активность, что указывает на антипролиферативный и онкопрофилактический потенциал ХС/ГС [48].

Все описанные выше противоопухолевые эффекты ХС и ГС подразумевают, что используются высокоочищенные формы ХС/ГС. Кроме того, препараты ХС должны быть стандартизированы по молекулярной массе и по паттернам сульфатирования. Наличие в препаратах ХС/ГС посторонних примесей (особенно белкового происхождения) будет провоцировать развитие аутоиммунных реакций, препятствующих развитию противовоспалительного и противоопухолевого эффектов ХС и ГС [49], приводить к вторичному синовиту [50] и др.

Посторонние белковые примеси в составе нестандартизированных экстрактов ХС природного происхождения будут провоцировать развитие провоспалительных реакций. Воспалительные клетки и медиаторы воспаления являются ключевым компонентом микроокружения опухоли и способствуют развитию опухоли [51]. Собственно, именно поэтому ингибиторы провоспалительных киназ и используются как противоопухолевые средства [52].

Наглядной иллюстрацией опасности использования нестандартизированных препаратов ХС, содержащих посторонние белковые примеси, является опубликованный в литературе случай из практики. Инъекции гликозамингликан-пептидного комплекса (Арумалон) пациентке 62 лет с дегенеративными изменениями тазобедренного сустава привели к тяжелым осложнениям: температура до 39 °С, отеки пальцев, суставов рук и колен, сыпь на коже, повышение уровней лейкоцитов и 2–3-кратное повышение уровней печеночных ферментов в крови. Эффект нестандартизированного препарата ХС был подтвержден положительным тестом на трансформацию лимфоцитов в культуре и наличием специфических антител в культивируемой жидкости лимфоцитов, в то время как сыворотка была отрицательной для антител. Только через 1 год после приема поддерживающей дозы преднизона (15 мг/сут) пациентка полностью избавилась от описанной симптоматики. Таким образом, нестандартизированные препараты ХС, особенно с нестандартизированными белковыми примесями животного происхождения, имеют повышенный риск системных побочных эффектов [53].

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Такие микронутриенты, как ХС и ГС, оказывают многогранное воздействие на организм. Молекулы ХС и ГС вырабатываются хондроцитами и являются одними из основных структурных компонентов хряща и синовиальной жидкости. Кроме восстановления соединительной ткани ХС и ГС проявляют противовоспалительную, иммуномодулирующую, антипролиферативную и другие эффекты. Противоопухолевое действие ХС/ГС распространяется на различные типы опухолей (глиома, рак толстой кишки, легких, молочной железы, яичников, предстательной железы, почек, мочевого пузыря и др.). И ХС, и ГС вза-

имодействуют с рецептором CD44, способствуя снижению хронического воспаления, торможению пролиферации и стимулированию апоптоза опухолевых клеток.

Кроме того, молекула ГС ингибирует метаболизм тимицина в опухолевых клетках, модулирует процессы гликозилирования белков, тормозит цикл клеточного деления, ингибирует протеасомы, вызывает аутофагическую гибель опухолевых клеток посредством стимуляции стресса в эндоплазматическом ретикулуме, инактивирует рецептор андрогенов, что также способствует специфической противоопухолевой активности.

Молекулы ХС стимулируют апоптоз опухолевых клеток, подавляют экспрессию фактора роста эндотелия сосудов фактор (VEGF) и активность матриксных металлопротеиназ, ингибируют активность каскада Wnt/бета-катенин. Способствуя инкапсуляции опухолевых образований, молекулы ХС тормозят процесс метастазирования. Имеющие данные крупномасштабных клинических исследований указывают на перспективность использования ХС/ГС для долговременной профилактики опухолевых заболеваний.

Перспективными направлениями дальнейших исследований являются (1) хемокиномный анализ свойств молекулы ГС, который позволит соотнести эффекты ГС с эффектами известных противоопухолевых препаратов — ингибиторов киназ, (2) хемотранскриптомное исследование эффектов ГС в отношении опухолевых клеток (например, клеток линии MCF7 рака молочных желез), которое позволяет рассмотреть противоопухолевое воздействие ГС на транскриптом опухолевых клеток человека, (3) хемореактомное моделирование эффектов воздействия ГС и молекул сравнения на различные линии опухолевых клеток в культуре.

**Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18–07–01022, 18–07–00944, 16–29–12936.**

## Литература

1. Громова О.А., Торшин И.Ю., Лиля А.М., Громов А.Н. Молекулярные механизмы глюкозамина сульфата при лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний суставов и позвоночника: результаты протеомного анализа. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2018;10(2):38–44. [Gromova O.A., Torshin I.Yu., Leela A.M., Gromov A.N. Molecular mechanisms of glucosamine sulfate in the treatment of degenerative-dystrophic diseases of the joints and spine: the results of proteomic analysis. *Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics*. 2018;10(2):38–44 (in Russ.).]
2. Quastel J., Cantero A. Inhibition of tumour growth by D-glucosamine. *Nature*. 1953;171(4345):252–254.
3. Sorkin E., Fjelde A. The effect of D-glucosamine and related products on human cancer cells in tissue culture. *G Ital Chemioter*. 1956;3(3–4):355–361.
4. Luhrs W. A contribution to the question glucosamine on the growth retardation of tumours. *Acta Unio Int Contra Cancrum*. 1957;13(3):480–481.
5. Громова О.А., Торшин И.Ю., Лиля А.М. и др. Дифференциальный хемореактомный анализ глюкозамина сульфата и нестероидных противовоспалительных препаратов: перспективные синергичные комбинации. *Современная ревматология*. 2018;12(2):36–43. [Gromova O.A., Torshin I.Yu., Leela A.M. et al. Differential chemoreactomic analysis of glucosamine sulfate and nonsteroidal anti-inflammatory drugs: promising synergistic combinations. *Modern rheumatology*. 2018;12(2):36–43 (in Russ.).]
6. Торшин И.Ю., Громова О.А., Лиля А.М. и др. Результаты постгеномного анализа молекулы глюкозамина сульфата указывают на перспективы лечения коморбидных заболеваний. *Современная ревматология*. 2018;12(4):129–136. [Torshin I.Yu., Gromova O.A., Leela A.M. The results of the post-genomic analysis of the glucosamine sulfate molecule indicate the prospects for the treatment of comorbid diseases. *Modern rheumatology*. 2018;12(4):129–136 (in Russ.).]
7. Torshin I.Yu., Rudakov K.V. Combinatorial analysis of the solvability properties of the problems of recognition and completeness of algorithmic models. Part 2: metric approach within the framework of the theory of classification of feature values. *Pattern Recognition and Image Analysis*. 2017;27(2):184–199.
8. Torshin I.Y., Rudakov K.V. Combinatorial analysis of the solvability properties of the problems of recognition and completeness of algorithmic models. Part 1: factorization approach. *Pattern Recognition and Image Analysis*. 2017;27(1):16–28.

Полный список литературы Вы можете найти на сайте <http://www.rmj.ru>



9. Torshin I.Yu., Rudakov K.V. On the theoretical basis of metric analysis of poorly formalized problems of recognition and classification. *Pattern Recognition and Image Analysis*. 2015;25(4):577–587.
10. Torshin I.Y., Rudakov K.V. On metric spaces arising during formalization of problems of recognition and classification. Part 1: properties of compactness. *Pattern Recognition and Image Analysis*. 2016;26(2):274–284.
11. Torshin I.Yu., Rudakov K.V. On metric spaces arising during formalization of problems of recognition and classification. Part 2: density properties. *Pattern Recognition and Image Analysis*. 2016;26(3):483–496.
12. Торшин И.Ю., Гусев Е.И., Громова О.А. и др. Мировой опыт изучения эффектов омега-3 полиненасыщенных жирных кислот: влияние на когнитивный потенциал и некоторые психические расстройства. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2011;111(11):79–86. [Torshin I. Yu., Gusev E.I., Gromova O.A. et al. International experience in studying effects of omega-3 polyunsaturated fatty acids: the influence on cognitive abilities and some mental disorders. *S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2011;111(11):79–86 (in Russ.).]
13. Громова О.А., Торшин И.Ю., Калачева А.Г. и др. Перспективы использования стандартизированных форм омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в неврологии. *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. 2012;112(1):101–105. [Gromova O.A., Torshin I. Yu., Kalacheva A.G. et al. The perspective lines of using standardized forms of omega-3 polyunsaturated fatty acids in neurology. *S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry*. 2012;112(1):101–105 (in Russ.).]
14. Masuda S., Azuma K., Kurozumi S. et al. Anti-tumor properties of orally administered glucosamine and N-acetyl-D-glucosamine oligomers in a mouse model. *Carbohydr Polym*. 2014;111:783–737. DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.04.102. Epub2014 May 10.
15. Chou W.Y., Chuang K.H., Sun D. et al. Inhibition of PKC-Induced COX-2 and IL-8 Expression in Human Breast Cancer Cells by Glucosamine. *J Cell Physiol*. 2015;230(9):2240–2251. DOI: 10.1002/jcp.24955.
16. Tsai C.Y., Lee T.S., Kou Y.R., Wu Y.L. Glucosamine inhibits IL-1beta-mediated IL-8 production in prostate cancer cells by MAPK attenuation. *J Cell Biochem*. 2009;108(2):489–498. DOI: 10.1002/jcb.22278.
17. Chesnokov V., Gong B., Sun C., Itakura K. Anti-cancer activity of glucosamine through inhibition of N-linked glycosylation. *Cancer Cell Int*. 2014;14:45. DOI: 10.1186/1475-2867-14-45.
18. Hosea R., Hardiany N.S., Ohneda O., Wanandi S.I. Glucosamine decreases the stemness of human ALDH(+) breast cancer stem cells by inactivating STAT3. *Oncol Lett*. 2018;16(4):4737–4744. DOI: 10.3892/ol.2018.9222.
19. Yu Z., Ju Y., Liu H. Antitumor effect of glucosamine by suppressing the phosphorylation of FOXO. *Mol Med Rep*. 2017;16(3):3395–3400. DOI: 10.3892/mmr.2017.6976.
20. Friedman S.J., Kimball T., Trotter C.D., Skehan P.J. The inhibition of thymidine kinase in glioma tumor cells by an amino sugar, D-glucosamine. *Cancer Res*. 1977;37(4):1068–1074.
21. Friedman S.J., Trotter C.D., Kimball T., Skehan P.J. The inhibition of thymidine metabolism in tumor cells treated with D-glucosamine. *Cancer Res*. 1977;37(4):1141–1146.
22. Wang L.S., Chen S.J., Zhang J.F. et al. Anti-proliferative potential of Glucosamine in renal cancer cells via inducing cell cycle arrest at G0/G1 phase. *BMC Urol*. 2017;17(1):38. DOI: 10.1186/s12894-017-0221-7.
23. Cocchiola R., Lopreiato M., Guazzo R. et al. The induction of Maspin expression by a glucosamine-derivative has an antiproliferative activity in prostate cancer cell lines. *Chem Biol Interact*. 2019;300:63–72. DOI: 10.1016/j.cbi.2019.01.014.
24. Liu B.Q., Meng X., Li C. et al. Glucosamine induces cell death via proteasome inhibition in human ALVA41 prostate cancer cell. *Exp Mol Med*. 2011;43(9):487–493. DOI: 10.3858/emmm.2011.43.9.055.
25. Hwang M.S., Baek W.K. Glucosamine induces autophagic cell death through the stimulation of ER stress in human glioma cancer cells. *Biochem Biophys Res Commun*. 2010;399(1):111–116. DOI: 10.1016/j.bbrc.2010.07.050.
26. Guo J., Hu J., Cao R. et al. Androgen Receptor Is Inactivated and Degraded in Bladder Cancer Cells by Phenyl Glucosamine via miR-449a Restoration. *Med Sci Monit*. 2018;24:2294–2301.
27. Oh H.J., Lee J.S., Song D.K. et al. D-glucosamine inhibits proliferation of human cancer cells through inhibition of p70S6K. *Biochem Biophys Res Commun*. 2007;360(4):840–845. DOI: 10.1016/j.bbrc.2007.06.137.
28. Liang Y., Xu W., Liu S. et al. N-Acetyl-Glucosamine Sensitizes Non-Small Cell Lung Cancer Cells to TRAIL-Induced Apoptosis by Activating Death Receptor 5. *Cell Physiol Biochem*. 2018;45(5):2054–2070. DOI: 10.1159/000488042.
29. Liu X., Liu Y., Hao J. et al. In Vivo Anti-Cancer Mechanism of Low-Molecular-Weight Fucosylated Chondroitin Sulfate (LFCS) from Sea Cucumber *Cucumaria frondosa*. *Molecules*. 2016;21(5):21050625. DOI: 10.3390/molecules21050625.
30. Prinz R.D., Willis C.M., Vilorio-Petit A., Kluppel M. Elimination of breast tumor-associated chondroitin sulfate promotes metastasis. *Genet Mol Res*. 2011;10(4):3901–3913. DOI: 10.4238/2011.December.8.9.
31. Silver D.J., Siebzehnrubl F.A., Schildts M.J. et al. Chondroitin sulfate proteoglycans potently inhibit invasion and serve as a central organizer of the brain tumor microenvironment. *J Neurosci*. 2013;33(39):15603–15607. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.3004-12.2013.
32. Rani A., Baruah R., Goyal A. Prebiotic Chondroitin Sulfate Disaccharide Isolated from Chicken Keel Bone Exhibiting Anticancer Potential Against Human Colon Cancer Cells. *Nutr Cancer*. 2018;29:1–15. DOI: 10.1080/01635581.2018.1521446.
33. Ferro M., Giuberti G., Zappavigna S. et al. Chondroitin sulphate enhances the antitumor activity of gemcitabine and mitomycin-C in bladder cancer cells with different mechanisms. *Oncol Rep*. 2012;27(2):409–415. DOI: 10.3892/or.2011.1526.
34. Nadanaka S., Kinouchi H., Kitagawa H. Chondroitin sulfate-mediated N-cadherin/ beta-catenin signaling is associated with basal-like breast cancer cell invasion. *J Biol Chem*. 2018;293(2):444–465. DOI: 10.1074/jbc.M117.814509.
35. Pudelko A., Wisowski G., Olczyk K., Kozma E.M. The dual role of the glycosaminoglycan chondroitin-6-sulfate in the development, progression and metastasis of cancer. (Electronic resource). URL: <https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/febs.14748> (access date: 09.04.2019). DOI: 10.1111/febs.14748.
36. Oliveira-Ferrer L., Hessling A., Trillsch F. et al. Prognostic impact of chondroitin-4-sulfotransferase CHST11 in ovarian cancer. *Tumour Biol*. 2015;36(11):9023–9030. DOI: 10.1007/s13277-015-3652-3.
37. Kalathas D., Triantaphyllidou I.E., Mastronikolis N.S. et al. The chondroitin/dermatan sulfate synthesizing and modifying enzymes in laryngeal cancer: expression and epigenetic studies. *Head Neck Oncol*. 2010;2:27. DOI: 10.1186/1758-3284-2-27.
38. Martins J.R., Gadelha M.E., Fonseca S.M. et al. Patients with head and neck tumors excrete a chondroitin sulfate with a low degree of sulfation: a new tool for diagnosis and follow-up of cancer therapy. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2000;122(1):115–118. DOI: 10.1016/S0194-5998(00)70158-6.
39. Dietrich C.P., Martins J.R., Sampaio L.O., Nader H.B. Anomalous structure of urinary chondroitin sulfate from cancer patients. A potential new marker for diagnosis of neoplasias. *Lab Invest*. 1993;68(4):439–445.
40. Teng Y.H., Tan P.H., Chia S.J. et al. Increased expression of non-sulfated chondroitin correlates with adverse clinicopathological parameters in prostate cancer. *Mod Pathol*. 2008;21(7):893–901. DOI: 10.1038/modpathol.2008.70.
41. Poh Z.W., Gan C.H., Lee E.J. et al. Divergent Synthesis of Chondroitin Sulfate Disaccharides and Identification of Sulfate Motifs that Inhibit Triple Negative Breast Cancer. *Sci Rep*. 2015;5:14355. DOI: 10.1038/srep14355.
42. Vallen M.J., Schmidt S., Oosterhof A. et al. Primary ovarian carcinomas and abdominal metastasis contain 4,6-disulfated chondroitin sulfate rich regions, which provide adhesive properties to tumour cells. *PLoS One*. 2014;9(11):e111806. DOI: 10.1371/journal.pone.0111806.
43. Willis C.M., Kluppel M. Chondroitin sulfate-E is a negative regulator of a pro-tumorigenic Wnt/beta-catenin-Collagen 1 axis in breast cancer cells. *PLoS One*. 2014;9(8):e103966. DOI: 10.1371/journal.pone.0103966.
44. Лиля А.М., Громова О.А., Торшин И.Ю. и др. Молекулярные эффекты хондрокарда при остеоартрите и грыжах межпозвоночного диска. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2017;9(3):88–97. DOI: <http://dx.doi.org/10.14412/2074-2711-2017-3-88-97>.
45. Wang J., Zhao W., Chen H. et al. Anti-tumor Study of Chondroitin Sulfate-Methotrexate Nanogels. *Nanoscale Res Lett*. 2017;12(1):572. DOI: 10.1186/s11671-017-2324-1.
46. Rivlin M., Navon G. Glucosamine and N-acetyl glucosamine as new CEST MRI agents for molecular imaging of tumors. *Sci Rep*. 2016;6:32648. DOI: 10.1038/srep32648.
47. Kantor E.D., Newton C.C., Giovannucci E.L. et al. Glucosamine use and risk of colorectal cancer: results from the Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort. *Cancer Causes Control*. 2018;29(3):389–397. DOI: 10.1007/s10552-018-1003-6.
48. Kantor E.D., Zhang X., Wu K. et al. Use of glucosamine and chondroitin supplements in relation to risk of colorectal cancer: Results from the Nurses' Health Study and Health Professionals follow-up study. *Int J Cancer*. 2016;139(9):1949–1957. DOI: 10.1002/ijc.30250.
49. Pavelká K., Gatterová J., Gollerová V. et al. A 5-year randomized controlled, double-blind study of glycosaminoglycan polysulphuric acid complex (Rumalon) as a structure modifying therapy in osteoarthritis of the hip and knee. *Osteoarthritis Cartilage*. 2000;8(5):335–342.
50. Заводовский Б.В., Коваленко Е.А., Фофанова Н.А. и др. Связь уровня антител к гликозаминогликанам хряща у больных остеоартрозом с эффективностью лечения хондропротекторами. *Терапевтический архив*. 1999;5:47–50.
51. Bottazzi B., Riboli E., Mantovani A. Aging, inflammation and cancer. *Semin Immunol*. 2018;40:74–82. DOI: 10.1016/j.smim.2018.10.011.
52. Kargbo R.B. Kinase Inhibitors for Treatment of Cancer and Inflammation. *ACS Med Chem Lett*. 2018;9(11):1073–1074. DOI: 10.1021/acsmchemlett.8b00481.
53. Berg P.A., Kaboth U., Becker E.W., Klein R. The analysis of a severe side effect of a cartilage-protective agent by immunological studies. *Dtsch Med Wochenschr*. 1992;117(42):1589–1593.